

Ornithologischer Reisebericht Madeira (Portugal): 22. – 29. August 2020

Helmut Laußmann



Bulwer's Petrel (Bulwersturm)

Allgemeines

Die zu Portugal gehörende Insel Madeira ist etwa 740 km² groß und liegt über 700 km vor der marokkanischen Küste. Die begrenzte Größe und die recht isolierte Lage führen dazu, dass Madeira verglichen mit dem europäischen Festland recht artenarm ist, aber auch einige Endemiten beherbergt. Herausragend sind zum einen die ausgedehnten Lorbeerwälder sowie die guten Beobachtungsmöglichkeiten von Seevögeln. Im Verlauf der einwöchigen Reise konnte ich zwar nur 38 Vogelarten beobachten, darunter waren aber 3 endemische Arten (Madeirasturm, Silberhalstaube und Madeiragoldhähnchen).

Zum Herumreisen empfiehlt sich ein Mietwagen, mit dem die Insel von einem Standort aus gut erkundet werden kann. Madeira ist bei Touristen sehr beliebt; die touristische Infrastruktur ist hervorragend. Aufgrund der im August 2020 herrschenden Covid 19-Situation und den daraus resultierenden Einreisebeschränkungen (Test bei Einreise oder Nachweis über negativen Test) waren die Unterkünfte nur zu einem geringen Anteil belegt.

Wer Seevögel aus nächster Nähe sehen will, dem ist eine Pelagic Tour mit Windbirds (www.madeirawindbirds.com) zu empfehlen. Mit ihrem hochseetauglichen Schlauchboot Oceanodroma werden Fahrten aufs offene Meer angeboten (je 7 Stunden auf drei aufeinander folgenden Nachmittagen). Bei dieser exklusiven Tour geht es allerdings nicht immer gemütlich zu: So ist insbesondere bei stärkerem Wellengang häufig mit Spritzwasser und unsanften Landungen in den Wellentälern zu rechnen. Rücken und Knie werden dabei etwas strapaziert. Eine halbwegs durchschnittliche Fitness und eine eher geringe Anfälligkeit für Seekrankheit sollten vorhanden sein. Für die Unannehmlichkeiten wird man mit unvergesslichen Seevogel-Beobachtungen belohnt!

Ich wählte als Standort die Kleinstadt Machico, da von dort die Pelagic-Touren starteten. Die gemütliche Stadt besitzt eine sehr gute touristische Infrastruktur und die Wege zum Strand und zu Restaurants können im Regelfall fußläufig zurückgelegt werden.

Das Wetter war während meines Aufenthaltes sehr angenehm. Tagsüber lagen die Temperaturen bei 25 bis 30°C, nachts bei etwa 23°C. Wer in den Bergen unterwegs ist, sollte eine Jacke dabei haben. Für die Pelagic-Tour sind Regenjacke und Regenhose sowie warme Kleidung notwendig.

Reiseroute

Sa 22.08.2020:

Fahrt nach Frankfurt – Direktflug von Frankfurt nach Madeira – Machico (Quarantäne).

So 23.08.2020:

Machico – Lorbeerwald bei Ribera Frio: Balcones, Aussichtspunkt 500 m südlich des Ortes (Blickrichtung Osten) – Fajã da Nogueira; abends Pico de Arieiro mit Windbirds.

Mo 24.08.2020:

Machico – Ponta de São Lourenço – Pelagic mit Windbirds.

Di 25.08.2020:

Machico – Funchal (Marina) – Pelagic mit Windbirds.

Mi 26.08.2020:

Machico – Steppe bei Canical – Pelagic mit Windbirds.

Do 27.08.2020:

Machico – Lorbeerwald am Encumeada-Pass – Sao Vicente – Porto Moniz – Lagoa do Lugar de Baixo – Ribeira Brava – Funchal (Marina, Lido Beach).

Fr 28.08.2020:

Machico – Madalena do Mar (SW-Küste) – Ponta do Pargo – Lorbeerwald 3 km südlich von Seixal – Porto Moniz.

Sa 29.08.2020:

Machico – Direktflug von Madeira nach Frankfurt.

Beobachtungsgebiete

Machico

Machico ist mit rund 11.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Madeiras. Sie liegt nahe dem internationalen Flughafen im Südosten der Insel. Die angrenzenden Berge sind Brutgebiet des Gelbschnabeltauchers. Am Machico-Fluss kommen Moschusente, Stockente, Teichhuhn, Gebirgsstelze und Wellenastrild vor. Im Mündungsbereich und am Strand sind manchmal Limikolen und Seeschwalben anzutreffen.



Blick auf Machico.

Ponta de Sao Lourenco und Steppe bei Canical

Ponta de Sao Lourenco liegt im äußersten Westen der Insel. Diese Halbinsel ist ebenso wie die angrenzende Umgebung von Canical nahezu baumlos. Die landschaftlich attraktive Gegend ist artenarm. Ich beobachtete hier u.a. Kanarenpieper, Rothuhn, Turmfalke und Einfarbsegler.




Ponta de Sao Lourenco ist landschaftlich sehr attraktiv und liegt im äußersten Westen Madeiras

Lorbeerwald bei Ribera Frio und Faja da Nogueira

Das im östlichen Landesinneren gelegene Ribera Frio gehört zu den attraktivsten Ausgangspunkten zur Erkundung der typischen Lorbeerwälder. Einer der touristischen

Hauptattraktionen ist der Aussichtspunkt Balcones, der durch eine kurze Wanderung von Ribera Frio erreichbar ist. In der Nähe liegt die Ebene Faja da Nogueira, die über einen ungeteerten Weg erschlossen ist. Silberhalstaube und Madeiragoldhähnchen sind in dieser Region nicht selten.



In der Umgebung von Ribera Frio gibt es ausgedehnte Lorbeerwälder.

Pico de Ariero

Nördlich von Funchal im Landesinneren liegt der Pico de Ariero. Mit über 1.800 m ü.M. ist er der dritthöchste Berg Madeiras. Eine Straße führt fast bis zum Gipfel. Windbirds bietet Nachtexkursionen in diese Region an, um die eindrucksvollen Rufe der weltweit nur hier brütenden Madeirasturmvögel (Brutbestand etwa 85 Paare!) zu erleben – meines Erachtens ein exklusives und unvergessliches Erlebnis. Bisweilen sind dabei diese Vögel auch schemenhaft zu sehen.

Funchal

Entlang der Marina von Funchal können Möwen und Seeschwalben beobachtet werden. Hier gibt es auch gute Chancen, Rosenseeschwalben zu sehen (ich sah keine).

Lorbeerwald am Encumeada-Pass

Der Encumeada-Pass liegt im Zentrum der Insel. Hier sind Reste des Lorbeerwaldes vorhanden. Silberhalstaube und Madeiragoldhähnchen kommen hier vor.

Lagoa do Lugar de Baixo

Dieses Feuchtgebiet liegt an der Küste westlich von Funchal. Es ist nur wenige Hektar groß, beherbergt aber dennoch eines der größten Stillgewässer Madeiras. Ich sah hier u.a. Stockente, Moschusente, Blässhuhn und Wellenastrild.

Ribera Brava

Die Kleinstadt Ribera Brava liegt etwa 15 km westlich von Funchal. An der Küste rasteten neben Mittelmeermöwen auch Heringsmöwen und Flusseeschwalben.



Am Encumeada-Pass gibt es neben Lorbeerwald-Resten auch kleine Ackerflächen.

Ponta do Pargo

Am westlichsten Punkt Madeiras gibt es in Küstennähe oberhalb der Steilküste ein baumfreies Plateau. Typische Arten sind in den vegetationsarmen Bereichen Kanarenpieper und in den niedrigen Gebüschern Brillengrasmücken.



Ponta do Pargo liegt im äußersten Westen Madeiras. In den niedrigen Gebüschern kommen Brillengrasmücken vor.

Lorbeerwald südlich Seixal

Unweit der an der Nordküste gelegenen Kleinstadt Seixal befinden sich ausgedehnte Lorbeerwälder. Hier sind Silberhalstauben recht häufig zu beobachten.



Der Lorbeerwald südlich Seixal beherbergt gute Bestände der endemischen Silberhalstaube.

Porto Moniz

Die im Nordwesten der Insel liegende Kleinstadt ist ein guter Ort zum Seawatching. Die Beobachtungsfrequenz von Seevögel stieg am späten Nachmittag deutlich an. Ich beobachtete hier u.a. Gelbschnabel-, Atlantik- und Großen Sturmtaucher.



Porto Moniz im Norden von Madeira – berühmt für die natürlichen Wasserbecken im Vulkangestein und für die guten Möglichkeiten zum Seawatching.

Sao Vicente


Im Bereich der Flussmündung bei Sao Vicente sah ich u.a. Moschusente, Seidenreiher, Regenbrachvogel und Flusseeeschwalbe.

Pelagic Tour

Die von Windbirds angebotenen Pelagic-Touren bieten die Gelegenheit für exklusive Seevogel-Beobachtungen. Wir sahen auf diesen Touren aus nächster Nähe u.a. Bulwerstumvogel, Maideirasturmvogel, Kapverdensturmvogel und Großen Sturmtaucher. Regelmäßig werden auf den Touren auch Madeirawellenläufer, Buntfußsturmschwalben und Weißgesichtssturmschwalben gesehen – wir hatten mit diesen drei Arten allerdings kein Glück.



Mit dem Boot Oceanodroma führt Windbirds die Pelagic-Touren durch.



Übersicht der wesentlichen Beobachtungsgebiete; roter Punkt: Machico; blaue Punkte: ungefähren Ziele der Pelagic-Touren; grüne Punkte: Gebiete mit Lorbeerwald; brauner Punkt: Pico der Arieiro; gelbe Punkte: sonstige Gebiete an der Küste. (Basiskarte aus openstreetmap.org; © OpenStreetMap-Mitwirkende.)

Artenliste Vögel: Madeira (Portugal), 22 – 29. August 2020 (38 Arten)

Abkürzungen:

M = Männchen (male); W = Weibchen (female)


ANSERIFORMES: Anatidae

Mallard *Anas platyrhynchos* (Stockente)


Regelmäßig am Machico-Fluss, so 4 am 22/8, 4 am 23/8, 3 am 25/8 sowie 7 am 28/8 (davon 2 ohne sichtbaren Einfluss von Domestizierung). Außerdem 2 im Feuchtgebiet Lugar de Baixo (davon 1 W ohne sichtbaren Einfluss von Domestizierung; **Foto**).

Muscovy Duck *Cairina moschata* (Moschusente)

Eingeführte Art. Regelmäßig am Machico Fluss, so ca. 30 vom 22/8 bis 24/8 (**Foto**) und ca. 40 am 25/8 & 28/8. Neben wildfarbenen auch weiße und gescheckte Individuen. Am 28/8 hier auch 1 W mit 12 ca. 7-tägigen juv. (Mischung aus wildfarbenen und einfarbig hellen juv.). Am 27/8 außerdem 4 bei Sao Vicente, ca. 5 Lugar de Baixo & 5 bei Ribera Brava.



Muscovy Duck (Moschusente)



Mallard (Stockente)

GALLIFORMES: Phasianidae

Red-legged Partridge *Alectoris rufa* (Rothuhn)

Eingeführte Art. 26/8: 2 Steppe bei Canical.

COLUMBIFORMES: Columbidae

Rock Dove *Columba livia* (Felsentaube)

Weit verbreitet und häufig, täglich gesehen vom 22/8 – 29/8, erstmals ca. 5 am 22/8 in Machico. Nur etwa ein Drittel wildfarben.

***Madeira Laurel Pigeon** *Columba trocaz* (Silberhalstaube)

23/8: 6 bei Ribera Frio & 5 Faja da Nogueira; 27/8: 2 im Lorbeerwald am Encumeada-Pass; 28/8: ca. 25 im Lorbeerwald südlich Seixal (**Fotos**).



Madeira Laurel Pigeon (Silberhalstaube)

Eurasian Collared Dove *Streptopelia decaocto* (Türkentaube)

Eingeführte Art. 22/8: 1 Machico, 23/8: 1 am Machico-Fluss; 26/8: 1 in Canical; 28/8: 5 in Amparo (2 km südlich von Ponta do Pargo, **Foto**).

CAPRIMULGIFORMES: Apodidae

Plain Swift *Apus unicolor* (Einfarbsegler)

Relativ häufig, täglich gesehen. 22/8: 2 Machico; 23/8: 3 bei Ribero Frio & ca. 10 Faja da Nogueira; 24/8: ca. 10 Ponta de Sao Lourenco; 25/8: ca. 5 Machico; 26/8: ca. 10 Steppe bei Canical (**Foto**); 27/8: ca. 5 Encumeada-Pass & ca. 20 Funchal (Lido Beach); 28/8: häufig, u.a. in Porto Moniz & Ponta do Pargo; 29/8: 2 Flughafen Madeira nahe Machico.



Plain Swift (Einfarbsegler)



Eurasian Collared Dove (Türkentaube)

GRUIFORMES: Rallidae

Common Moorhen *Gallinula chloropus* (Teichhuhn)

Regelmäßig am Machico-Fluss, so 3 am 22/8, 5 am 23/8 (**Foto**), 1 am 25/8 und 6 am 29/8 (einschl. 2 unselbständiger Jungtiere).

Common Coot *Fulica atra* (Blässhuhn)

27/8: 1 Sao Vicente (**Foto**), 1 Ribeira Brava, 4 Lugar de Baixo.



Common Moorhen (Teichhuhn)



Common Coot (Blässhuhn)

PROCELLARIIFORMES: Procellariidae

***Cape Verde Petrel** *Pterodroma feae* (Kapverdensturmvogel)

P. f. deserta. 25/8: 8 bei Pelagic (östlich Madeira; **1. Foto**); 26/8 3 bei Pelagic (südlich Madeira; **Fotos 2-6**).



Cape Verde Petrel (Kapverdensturmvoegel)

***Madeira Petrel** *Pterodroma madeira* (Madeirasturmvogel)

23/8: bei Nachtexkursion auf Pico de Areeiro mehrfach Rufe von Männchen und Weibchen sowie 3x kurz schemenhaft gesehen; 24/8: 1 bei Pelagic (nordöstlich Madeira; **Fotos**).



Madeira Petrel (Madeirasturmvogel)

***Great Shearwater** *Ardenna gravis* (Großer Sturmtaucher)


24/8: 1 bei Pelagic (nordöstlich Madeira; **Fotos**); 25/8: 3 bei Pelagic (östlich Madeira); 28/8: 3 bei Seawatching vor Porto Moniz nach Westen.

Cory's Shearwater *Calonectris (diomedea) borealis* (Corysturmtaucher)

Häufigste Sturmtaucherart, auch regelmäßig von Land aus zu sehen. 23/8: einige Ex. vor Machico; 24/8: ca. 200 bei Pelagic (nordöstlich Madeira); 25/8: ca. 500 bei Pelagic (östlich Madeira; **Fotos**); 26/8: ca. 100 bei Pelagic (südlich Madeira); 27/8: ca. 25 vor Machico; 28/8: ca. 250 bei Seawatching vor Porto Moniz nach Westen; 29/8: mind. 10 vor Machico.



Great Shearwater (Großer Sturmtaucher)



Cory's Shearwater (Gelbschnabelsturmtaucher)



Bulwer's Petrel (Bulwersturmvogel)

Manx Shearwater *Puffinus puffinus* (Atlantiksturmtaucher)

28/8: 8 (4 + 2 + 1 + 1) bei Seawatching vor Porto Moniz nach Westen.

Bulwer's Petrel *Bulweria bulwerii* (Bulwersturmvogel)

24/8: ca. 50 bei Pelagic (nordöstlich Madeira); 25/8: ca. 50 bei Pelagic (östlich Madeira; **Foto 6**); 26/8: ca. 500 bei Pelagic (südlich Madeira; **Fotos 1-5**).

PELECANIFORMES: Ardeidae

Grey Heron *Ardea cinerea* (Graureiher)

27/8: 4 überfliegen die Marina in Funchal (**Foto**).

Little Egret *Egretta garzetta* (Seidenreiher)

27/8: 1 Sao Vicente (**Foto**).



Grey Heron (Graureiher)



Little Egret (Seidenreiher)

CHARADRIIFORMES: Scolopacidae

Whimbrel *Numenius phaeopus* (Regenbrachvogel)

27/8: 1 Sao Vicente (**Foto**).


Ruddy Turnstone *Arenaria interpres* (Steinwälzer)

Regelmäßig am Machico-Fluss bzw. am Strand von Machico, so 5 am 23/8 (**Foto**), 5 am 24/8, 4 am 25/8, 1 am 26/8 und 8 am 29/8; außerdem 5 am 25/8 an der Marina von Funchal.

CHARADRIIFORMES: Stercorariidae

Long-tailed Skua *Stercorarius longicaudus* (Falkenraubmöwe)

24/8: 1 ad. bei Pelagic (nordöstlich Madeira).



Ruddy Turnstone (Steinwalzer)



Whimbrel (Regenbrachvogel)

CHARADRIIFORMES: Laridae

Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus* (Heringsmowe)

3 (2 ad. 1 imm.) an Flussmundung in Ribera Brava (**Foto**).

Yellow-legged Gull *Larus michahellis* (Mittelmeermowe)

Weit verbreitet und hufig, taglich gesehen. Erstmals ca. 15 am 22/8 in Machico. Groere Ansammlungen: am 25/8 ca. 200 in Funchal (Marina; **Foto 1**); am 28/8 ca. 200 in Funchal (Marina) & ca. 100 an der Kuste von Ribera Brava. Bei den Pelagic-Touren kustenfern nur 1 bis 3 Individuen (**Fotos 2 & 3**).



Lesser Black-backed Gull (Heringsmowe)



Yellow-legged Gull (Mittelmeermowe)



Yellow-legged Gull (Mittelmeermöwe), ad. & imm.

Common Tern *Sterna hirundo* (Flusseeschwalbe)

S. h. hirundo. Recht häufig, in allen möglichen Kleidern, auch vorjährige Individuen. 23/8: 1 ad. 1 juv. im Hafen von Machico; 24/8: 2 Ponta de Sao Lourenco; 25/8: 2 Funchal (Marina) und 2 Pelagic (östlich Madeira); 26/8: 5 Pelagic (südlich Madeira); 27/8: 8 Sao Vicente, 8 Porto Moniz & 4 Ribera Brava; 28/8: 1 Madalena do Mar (SW-Küste) & ca. 10 Porto Moniz; 29/8: 1 juv. Machico (**Foto**).

Sandwich Tern *Sterna sandvicensis* (Brandseeschwalbe)

25/8: 1 Funchal (Marina, **Foto**); 26/8: 3 bei Pelagic (südlich Madeira); 28/8: 1 Porto Moniz.



Common Tern (Flusseeschwalbe), 1. cy



Sandwich Tern (Brandseeschwalbe), imm.

ACCIPITRIFORMES: Accipitridae

Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus* (Sperber)

A. n. granti. 23/8: 1 Faja da Nogueira.

Eurasian Buzzard *Buteo buteo* (Mäusebussard)

22/8: 2 Machico, 23/8: 2 Ribera Frio (**Foto 2**), 28/8: 2 südlich Seixal (Lorbeerwald, **Foto 1**).



Eurasian Buzzard (Mäusebussard)

FALCONIFORMES: Falconidae

Common Kestrel *Falco tinnunculus* (Turmfalke)

F. t. canariensis. 22/8: 1 Machico, 23/8: 1 nahe Faja da Nogueira; 24/8: 1 Ponta de Sao Lourenco; 26/8: 2 Steppe bei Canical (**Foto 1**); 27/8: 1 am Encumeada-Pass & 1 Sao Vicente (**Foto 2**); 28/8: 1 Machico, 2 im Kulturland südlich Seixal & 1 Ponta do Pargo.



Common Kestrel (Turmfalke)

PASSERIFORMES: Estrildidae

Common Waxbill *Estrilda astrild* (Wellenastrild)

Eingeführte Art. Regelmäßig am Machico-Fluss nahe der Mündung, so ca. 10 am 23/8, 3 am 26/8 und ca. 30 am 29/8 (**Fotos**). Außerdem 5 im Feuchtgebiet Lugar de Baixo.



Common Waxbill (Wellenastrild)

PASSERIFORMES: Motacillidae

Berthelot's Pipit *Anthus berthelotii* (Kanarenpieper)

A. b. madeirensis. 26/8: 3 Steppe bei Canical, 28/8: 6 Ponta do Pargo (**Foto**).

Grey Wagtail *Motacilla cinerea* (Gebirgsstelze)

M. c. schmitzi. Auffallend häufig, meist an kleinen Flüssen. 22/8: 7x in Machico gesehen bzw. gehört; 23/8 1 Macicho-Fluss, 1 bei Ribera Frio & 2 Faja da Nogueira; 24/8: 1 Machico, 25/8: 1 Machico-Fluss; 26/8: 1 Machico-Fluss; 27/8: 3 Sao Vicente (**Foto**); 28/8: 5 Madalena do Mar (SW-Küste) & 1 Porto Moniz.



Berthelot's Pipit (Kanarenpieper)



Grey Wagtail (Gebirgsstelze)

PASSERIFORMES: Fringillidae

Common Chaffinch *Fringilla coelebs* (Buchfink)

F. c. maderensis. 23/8: ca. 10 bei Ribera Frio (Balcones; hier sehr zutraulich; **Fotos**) & 4 Faja da Nogueira; 28/8: 1 im Lorbeerwald westlich Porto Moniz & 1 im Lorbeerwald südlich Seixal.



Common Chaffinch (Buchfink), W & M

European Goldfinch *Carduelis carduelis* (Stieglitz)

C. c. parva. 23/8: 2 Ribera Frio, 27/8: 2 am Encumeada-Pass; 28/8: 1 im Kulturland südlich Seixal.

Atlantic Canary *Serinus canaria* (Kanarengirlitz)

22/8: 2 Machico, 23/8: 2 im Stadtpark von Machico & 11 nahe Faja da Nogueira (sitzen auf Leitungen); 26/8: 1 Steppe bei Canical, 28/8: 1 Madalena do Mar (SW-Küste) & 5 Ponta do Pargo; 29/8: 5 Machico (**Fotos**).



Atlantic Canary (Kanarengirlitz); M & W (links) sowie M (rechts)

PASSERIFORMES: Sylviidae

Eurasian Blackcap *Sylvia atricapilla* (Mönchsgrasmücke)

S. a. heineken. Relativ häufig, meist nur verhört, auch mehrfach Gesang, vor allem im Lorbeerwald. 23/8: 2 Machico-Fluss (1x gesehen), ca. 5 bei Ribera Frio & ca. 10 Faja da Nogueira; 27/8: ca. 10 im Lorbeerwald am Encumeada-Pass; 28/8: ca. 5 verhört im Lorbeerwald südlich Seixal; 29/8: 1 M nahe Mündung des Machico-Flusses (**Foto**).

Spectacled Warbler *Curruca conspicillata* (Brillengrasmücke)

C. c. orbitalis. 28/8: 2 im küstennahen Gebüsch bei Ponta do Pargo (**Foto**).



Eurasian Blackcap (Mönchsgrasmücke), M



Spectacled Warbler (Brillengrasmücke), M

PASSERIFORMES: Regulidae

***Madeira Firecrest** *Regulus madeirensis* (Madeiragoldhähnchen)

Recht häufig in Gebieten mit Lorbeerwald, oft in Familiengruppen. Diesjährige Individuen überwogen deutlich. 23/8: ca. 20 Faja da Nogueira (**Fotos**) sowie ca. 10 in der Umgebung von Ribera Frio; 27/8: ca. 10 im Lorbeerwald am Encumeada-Pass; 28/8: ca. 10 im Lorbeerwald südlich Seixal.

PASSERIFORMES: Muscicapidae

European Robin *Erithacus rubecula* (Rotkehlchen)

E. r. rubecula. 23/8: 1 verhört Faja da Nogueira; 27/8: 1 im Lorbeerwald am Encumeada-Pass (**Foto**).


PASSERIFORMES: Turdidae

Eurasian Blackbird *Turdus merula* (Amsel)

T. m. cabrerae. 23/8: 5 im Stadtpark von Machico & 1 Faja da Nogueira; 27/8: 2 verhört im Lorbeerwald am Encumeada-Pass.



Madeira Firecrest (Madeiragoldhähnchen); oben: adult, unten: 1. cy



European Robin (Rotkehlchen)

Sonstige Arten:

***Atlantic Spotted Dolphin** *Stenella frontalis* (Zügeldelfin)

25/8: ca. 10 bei Pelagic östlich von Madeira.

Brown Rat *Rattus norvegicus* (Wanderratte)

22/8 & 23/8: Je 1 in Machico.

***Perez's Frog** *Pelophylax perezii* (Iberischer Wasserfrosch)

Eingeführt. 23/8 & 29/8: Häufig an Süßwassertümpeln im Stadtpark von Machico.

Loggerhead Sea Turtle *Caretta caretta* (Unechte Karettschildkröte)

26/8: 1 bei Pelagic östlich von Madeira.

***Madeira Wall Lizard** *Teira dugesii* (Madeira-Mauereidechse)

Häufig, u.a. Faja da Nogueira (23/8), Ponta de Sao Lourenco (24/8, **Foto 1 & 2**) & Encumeada-Pass (27/8, **Foto 3**). Die Färbung ist sehr variabel.

Monarch *Danaus plexippus* (Monarch)

Nicht selten, u.a. in Machico (22/8).



Perez's Frog (Iberischer Wasserfrosch)



Madeira Wall Lizard (Madeira-Mauereidechse)